



METRO NASHVILLE  
ANIMAL CARE & CONTROL

## Instrucciones para los cuidados postoperatorios

- 1. Mantenga a su mascota tranquila y en el interior de la casa.** Los perros que requieran salir para hacer sus necesidades deberán hacerlo con una correa. No podrán correr, saltar, jugar, nadar, subir o hacer otras actividades extenuantes durante un lapso de entre 7 y 10 días. Mantenga a su mascota en el interior de la casa en un lugar donde pueda permanecer limpia, seca y cálida. Puede confinar a su mascota en el cuarto de baño o en un cajón cuando no esté en casa para supervisar su actividad. No bañe a su mascota durante este periodo de recuperación.
- 2. Controle el apetito y la respuesta a la alimentación de su mascota.** La anestesia puede causar náuseas y vómitos. El apetito debe regresar gradualmente dentro del lapso de 24 horas de realizada la cirugía. Comience por ofrecerle una pequeña cantidad de agua después de las 5 p.m. Si su perro no la vomita, ofrézcale de 1/3 a 1/2 de su alimentación normal después de las 6 p.m. Si su mascota vomita, entonces no la alimente de nuevo hasta el día siguiente por la mañana. No le ofrezca sobras, comida chatarra o leche durante el período de recuperación, estos alimentos en abundancia podrían causar malestar en el sistema digestivo de su mascota. Es posible que muchos de los pacientes no realicen deposiciones durante 24 y 36 horas después de la cirugía, esto es normal.
- 3. Consulte el sitio de la incisión dos veces al día.** La hinchazón y el enrojecimiento deberían ser mínimos y no debería haber drenaje. No permita que su perro se lama o mordisquee el lugar de la incisión. Si su mascota intenta lamerse la incisión, debe colocarle un collar isabelino que le impida lamerse o mordisquearse, pues esto podría causar una infección. No hay suturas externas que retirar.
- 4. Un letargo que dure más de 24 horas, diarrea o vómito no es normal.** Si se produce alguna de estos síntomas, su mascota debe ser examinada por un veterinario. Por favor, póngase en contacto con el Control y Atención Animal de Metro (Metro Animal Care and Control, MACC) a través del número que se muestra más adelante o, en caso de una emergencia después del horario de trabajo, lleve a su mascota a un veterinario de emergencia.

Por favor tenga en cuenta:

1. A su mascota se le ha colocado un tatuaje verde permanente en o cerca de la incisión (o cerca del ombligo en el caso de los gatos machos). Esto es para indicar que su mascota ya ha sido esterilizada o castrada y así evitar una cirugía exploratoria innecesaria en el futuro.
2. A su mascota se le administró un analgésico(s) inyectable(s) para controlar el dolor durante el período postoperatorio inmediato. Si su mascota necesita analgésicos adicionales, póngase en contacto con el MACC. **¡No administre a su mascota ningún analgésico que sea para humanos!**
3. No se alarme si los ojos de su mascota lucen "llorosos" o tienen mucosas. A su mascota se le aplicó un lubricante ocular en los ojos antes de la cirugía a fin de evitar que se resecan durante la anestesia.
4. Los animales pueden desarrollar una tos leve después de la cirugía debido al tubo de respiración (endotraqueal) colocado durante la anestesia. Si la tos es persistente o si presenta secreción nasal u ocular, su mascota puede tener una infección del tracto respiratorio superior (similar al resfriado en los humanos). Póngase en contacto con el MACC o con su veterinario habitual para realizar un examen y tratamiento.

Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a la cirugía o a la recuperación de su mascota, por favor póngase en contacto con:

Metro Animal Care and Control

De 8 a.m. a 4 p.m.

(615) 862-7928